



centre hospitalier
vétérinaire atlantia

DEPISTAGE RADIOGRAPHIQUE DE LA DYSPLASIE COXO-FEMORALE

| | |
|--|--|
| Nom: Maybee A la croisée des chemins | N° identification: 250269812181061 |
| Race: Altdeutsche Schaferhund | N° LOF: IHR217067 |
| Sexe: Femelle | Date prise du cliché: 13/12/2017 |
| Date de naissance: 10/12/2016 | Vétérinaire: Dr. CARON |
| Attestation conformité de l'identification: OUI | Numéro ordinal: 22179 |
| Identification infalsifiable du cliché: OUI | Identification complète du cliché: OUI |
| Radiographie localisée: OUI | Conditions de réalisation du cliché: S |
| Extension et symétrie du bassin: OUI | Parallélisme entre fémurs et fémurs-rachis: OUI |
| Rotules visibles: OUI | Rotules en position médiane: OUI |

LECTURE DU CLICHE

| Rapports articulaires | D | G | Tête et col fémoraux | D | G |
|---|---|---|---|---|---|
| Coaptation parfaite | ✓ | ✓ | Forme et volume normaux | ✓ | ✓ |
| Coaptation acceptable | | | Microcéphalie | | |
| Coaptation imparfaite | | | Ostéophytose céphalique | | |
| Pincement de l'interligne | | | Ostéophytose du col fémoral | | |
| Sub-luxation | | | | | |
| Luxation | | | | | |
| Acétabulum | | | Angle de Norberg-Olson | | |
| Normal | ✓ | ✓ | Angle supérieur ou égal à 105° | | |
| Manque de profondeur | | | Angle compris entre 100° et 105° | ✓ | ✓ |
| Evasé | | | Angle inférieur à 100° | | |
| Aplati | | | Angle inférieur à 90° | | |
| Comblé | | | | | |
| Rebord acétabulaire cranial enserrant | | | Couverture acétabulaire craniale correcte | ✓ | ✓ |
| Rebord acétabulaire cranial ouvert | | | Couverture acétabulaire craniale insuffisante | | |
| Ostéophytose du rebord acétabulaire cranial | | | Couverture acétabulaire dorsale correcte | ✓ | ✓ |
| Ostéophytose du rebord acétabulaire caudal | | | Couverture acétabulaire dorsale insuffisante | | |

| Résultat de l'examen | D | G | Qualification internationale (hanche la plus mal côté) B Dr. Alexandre CARON, le 07/01/2018 |
|---|---|---|--|
| A: Aucun signe de dysplasie coxo-fémorale | ✓ | | |
| B: Etat sensiblement normal | | ✓ | |
| C: Dysplasie coxo-fémorale légère | | | |
| D: Dysplasie coxo-fémorale moyenne | | | |
| E: Dysplasie coxo-fémorale sévère | | | |

Alexandre Caron
DVM, MRCVS, DipECVS
a.caron@chv-atlantia.com